Spectre d'efficacité de l'Onyx

Réalisé par le réseau BPE - eRcane

	IFTH →	1	1,8	2	1,66
	Herbicides →	**Onyx**	**Onyx + Dicopur 600**	**Onyx + Starane 200**	**Onyx + Callisto**
	Quantité	1,5 L/ha	1,5+1 L/ha	1,5+1 L/ha	1,5+1 L/ha
Genres-espèces	**Nom courant**				
Achyranthes aspera	herbe d'eugène				
Amaranthus dubius	pallaitère				
Cardiospermum microcarpum	liane poc poc				
Cyperus rotundus	oumine				
Euphorbia heterophylla	herbe de lait				
Solanum nigrum	morelle				
Bidens pilosa	piquant				
Argemone mexicana	chardon				
Commelina benghalensis	grosse herbe de l'eau				
Desmanthus virgatus	petit cassis				
Ipomoea hederifolia	liane fleur rouge				
Ipomoea nil	liane fleur bleue				
Momordica charantia	margose				
Phyllanthus amarus	petit tamarin blanc				
Phytolacca americana	faux vin				
Ricinus communis	ricin				
Fumaria muralis	fumeterre				

Niveau des efficacités :

: bonne efficacité : efficacité moyenne : efficacité faible : pas d'information

AMM 120 jours Onyx

Un nouveau désherbant de post levée a reçu une AMM de 120 jours. Il s'agit de l'Onyx (Certis Belchim), un herbicide à base de pyridate qui cible principalement les dicotylédones en post-levée. Il est sélectif de la canne à sucre. La dérogation autorise son utilisation durant la période du 30/09/2024 au 27/01/2025.

L'Onyx présente de bons résultats contre les dicotylédones au stade plantule. Lorsqu'il est associé à un autre herbicide tel que le 2,4-D ou le Banvel 4S dans un mélange binaire, son niveau d'efficacité s'améliore pour se situer au même niveau que celui à un mélange 2,4D + Callisto. L'Onyx présente peu d'intérêt en utilisation seule, il est donc plus intéressant de le coupler avec un autre herbicide.

La dose homologuée est de 1,5L/ha avec la possibilité de fractionner en 2 applications de 0,75L/ha.