Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

# Décision relative à une demande de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique et aux demandes associées

*Vu les dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et de ses textes d'application,*

*Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre III du titre V du livre II des parties législative et règlementaire,*

*Vu les demandes de renouvellement de l'autorisation de mise sur le marché, suite au renouvellement de l'approbation de la substance active pendiméthaline, d'extension d'usage mineur, de modifications des conditions d'autorisation, et vu les données fournies en réponse aux demandes de post-autorisation du produit phytopharmaceutique* ***PROWL 400***

| | |
|---|---|
| *de la société* | *BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS FRANCE SAS* |
| *enregistrées sous les* | *n° 2017-3307, 2018-3887, 2018-3895 et 2023-0169, 2012-2660, 2025-0768 et 2015-0104* |

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 27 juin 2022,*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 20 juillet 2023,*

*Vu les éléments complémentaires aux conclusions de l'évaluation transmis par la direction en charge de l'évaluation des produits règlementés de l'Anses le 9 août 2024,*

*Vu la notification de mise à jour de la classification en date du 27 septembre 2023,*

*Vu la décision du Directeur général de l'Anses du 28 mars 2025,*

*Vu le recours gracieux formé le 16 avril 2025 par la société BASF FRANCE SAS,*

*Vu la décision du Directeur général de l'Anses du 27 février 2026,*

*Vu le recours gracieux formé le 3 avril 2026 par la société BASF FRANCE SAS,*

*Vu les conclusions de l'évaluation de l'Anses du 23 juillet 2026,*

L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique désigné ci-après **est renouvelée** en France, sous réserve du respect de la composition du produit autorisée dans les conclusions de l'évaluation, pour les usages et dans les conditions précisés dans la présente décision et son annexe.

La présente décision abroge et remplace la décision du 27 février 2026 et s'applique sans préjudice des autres dispositions applicables.

**Avertissement :**

Le non-respect des conditions décrites ci-dessous peut entraîner le retrait ou la modification de l'autorisation ainsi que toute action incluant des poursuites judiciaires.

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

| **Informations générales sur le produit** | |
|---|---|
| **Noms du produit** | PROWL 400<br>FORKA<br>PROWL EXPERT |
| **Type de produit** | Produit de référence |
| **Titulaire** | BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS FRANCE SAS<br>21 chemin de la Sauvegarde<br>69134 ECULLY CEDEX<br>France |
| **Formulation** | Suspension concentrée (SC) |
| Contenant | 400 g/L - pendiméthaline |
| **Numéro d'intrant** | 8900681 |
| **Numéro d'AMM** | 8900681 |
| **Fonction** | Herbicide |
| **Gamme d'usage** | Professionnel |

L'échéance de validité de la présente décision est fixée à douze mois à compter de la date d'expiration de l'approbation de la substance active. A titre indicatif, dans l'état actuel du calendrier d'approbation des substances actives, l'échéance de l'autorisation est fixée au 15 janvier 2028.

Le dépôt d'une demande de renouvellement conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009, dans les trois mois suivant le renouvellement de l'approbation de la substance active, prolonge de plein droit l'autorisation de mise sur le marché après son arrivée à échéance de la durée nécessaire pour mener à bien l'examen et adopter une décision sur le renouvellement.

La présente décision peut être retirée ou modifiée avant cette échéance si des éléments le justifient.

A Maisons-Alfort, le 07/09/2026

DocuSigned by:
Charlotte Grastilleur
AE281A955A42454...

Directrice générale déléguée
en charge du pôle produits réglementés
Agence nationale de sécurité sanitaire de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES)

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



# ANNEXE : Modalités d'autorisation du produit

| **Vente et distribution** | |
|---|---|
| Le titulaire de l'autorisation peut mettre sur le marché le produit dans les emballages : | |
| **Emballage** | **Contenance** |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité | 1 L |
| Bidons en polyéthylène haute densité | 5 L ; 10 L |
| Bouteilles en polyéthylène haute densité / polyamide | 150 mL ; 250 mL ; 500 mL ; 1 L |
| Bidons en polyéthylène haute densité / polyamide | 3 L ; 5 L ; 10 L |

| **Classification du produit** | |
|---|---|
| La classification retenue est la suivante : | |
| **Catégorie de danger** | **Mention de danger** |
| Toxiques pour la reproduction - Catégorie 2 | H361d : Susceptible de nuire au fœtus |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1 | H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques |
| Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1 | H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |
| EUH208 : Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.<br><br>Pour les phrases P se référer à la règlementation en vigueur.<br><br>**Le titulaire de l'autorisation est responsable de la mise à jour de la fiche de données de sécurité et de la classification du produit en tenant compte de ses éventuelles évolutions**. | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15105912**<br>Blé*Désherbage | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur blé et triticale.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **13205901**<br>Canne à sucre*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 18 | F (BBCH 18) | 50 | - | - | Non concerné |
| | Efficacité également montrée pour un traitement annuel de 2,5 L/ha.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **16205901**<br>Carotte*Désherbage | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | F (BBCH 14) | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **19275901**<br>Céleri-branche*Désherbage | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **16405901**<br>Choux*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | - | F | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement en pré-plantation.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16755901**<br>Cucurbitacées à peau non comestible*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | entre les stades BBCH 11 et BBCH 19 | F (BBCH 19) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur melon et potiron.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **17405901**<br>Cultures florales et plantes vertes*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | entre les stades BBCH 00 et BBCH 14 | Non applicable | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur muguet.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **16855905**<br>Graines protéagineuses*Désherbage | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 18 | F (BBCH 18) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur les cultures d'hiver de féveroles, de pois protéagineux et de lupin.<br>L'usage est retiré à la dose de 3 L/ha car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 18 | F (BBCH 18) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur les cultures de printemps de féveroles, de pois protéagineux et de lupin.<br>Efficacité également montrée pour un traitement annuel de 2,5 L/ha.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha, car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **16575901**<br>Haricots et Pois écossés frais*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur pois écossés frais.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur fève fraîche.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de justifier la dose revendiquée.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **00517065**<br>Légumineuses potagères (sèches)*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | F (BBCH 07) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur cultures de printemps de pois-chiche.<br>L'usage est retiré sur les cultures d'hiver à la dose de 3 L/ha car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque inacceptable de contamination des eaux souterraines.<br>L'usage est également refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | F (BBCH 07) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur cultures d'hiver de pois-chiche.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **15555901**<br>Maïs*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | entre les stades BBCH 13 et BBCH 18 | F (BBCH 18) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur sorgho.<br>Efficacité également montrée pour un traitement annuel de 2,5 L/ha.<br>L'usage est refusé à dose de 1 L/ha, car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 18 | F (BBCH 18) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur maïs, miscanthus, millet et moha.<br>Efficacité également montrée pour un traitement annuel de 2,5 L/ha.<br>L'usage est refusé à dose de 1 L/ha, car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **16805901**<br>Oignon*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | F (BBCH 14) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **15105913**<br>Orge*Désherbage | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16845901**<br>Poireau*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 15 | F (BBCH 15) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur poireau.<br>L'usage est refusé sur le reste de la portée car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque de dépassement de la limite maximale de résidus.<br>L'usage est également refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **10995900**<br>Porte graine*Désherbage | **0,8 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 08 | Non applicable | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur concombre, cornichon et melon. | | | | | | | |
| | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 40 | Non applicable | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur graminées fourragères, fève et luzerne.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 50 | Non applicable | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur carotte, persil, céleri, panais, coriandre, échalote, fenouil, lupin vivace, choux, cerfeuil, aneth, chicorées bisannuelles, pois de senteur, poireau et ciboulette.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 08 | Non applicable | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur luzerne, trèfle violet, trèfle incarnat, trèfle blanc, sainfoin, vesce de printemps, reine-marguerite et haricot.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| | **1 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 08 | Non applicable | 20 (dont DVP 5) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur coloquinte, courgette, citrouille, oignon et potiron. | | | | | | | |
| **19335901**<br>PPAM - non alimentaires*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | Non applicable | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur bleuet, chardon-marie, millepertuis perforé et pyrèthre de Dalmatie.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>L'usage est refusé sur artichaut, cardon, bardane, cosmos, échinacée, garance et valériane car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit sur ces cultures.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car les données disponibles ne permettent pas de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | Non applicable | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur pavot de Californie et gaude.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de justifier la dose revendiquée.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **19995900**<br>PPAMC*Désherbage | **0,8 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 08 | 90 | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des graines. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **0,8 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 08 | 28 | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur cultures de coriandre, d'aneth et de cerfeuil destinées à la consommation des feuilles. | | | | | | | |
| | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | F (BBCH 07) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur onagre et sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de racines.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | 42 | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur cultures d'angélique et de livèche destinées à la production de feuilles.<br>L'usage sur sauge officinale est refusé car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | 42 | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur ciboulette.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | 28 | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur origan, romarin, sarriette vivace en culture installée après coupe.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>L'usage est refusé sur souci et thym car les données disponibles ne permettent pas de démontrer la sélectivité du produit. | | | | | | | |
| | **1,25 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | 28 | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur persil.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **16905901**<br>Salsifis*Désherbage | **2 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 14 | F (BBCH 14) | 20 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>La possibilité de fractionnement de la dose est refusée, car aucune donnée n'a été fournie permettant de s'assurer que ce mode d'application ne présente pas de risque d'effet nocif ou inacceptable. | | | | | | | |
| **15105915**<br>Seigle*Désherbage | **2,5 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 13 | F (BBCH 13) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

anses
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail

## Liste des usages autorisés

En l'absence de mention spécifique, les usages autorisés correspondent à une utilisation en plein champ.
En l'absence de restriction, les usages sont autorisés sur l'ensemble des cultures de la portée de l'usage.

| Usages | Dose maximale d'emploi | Nombre maximum d'applications | Stade d'application BBCH | Délai avant récolte (jours) | Zone Non Traitée aquatique (mètres) | Zone Non Traitée arthropodes non cibles (mètres) | Zone Non Traitée plantes non cibles (mètres) | Culture attractive en floraison (arrêté du 20/11/2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15805901**<br>Soja*Désherbage | **2,3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | F (BBCH 07) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement sur soja.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit.<br>L'usage sur arachide est retiré car les données disponibles ne permettent pas d'exclure un risque de dépassement de la limite maximale de résidus. | | | | | | | |
| **15855901**<br>Tabac*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | - | Non applicable | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement en pré plantation.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **16955901**<br>Tomate - Aubergine*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | - | F | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | Uniquement en pré-plantation.<br>L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |
| **15905901**<br>Tournesol*Désherbage | **3 L/ha** | **1/an** | jusqu'au stade BBCH 07 | F (BBCH 07) | 50 (dont DVP 20) | - | - | Non concerné |
| | L'usage est refusé à la dose de 1 L/ha car les données disponibles ne permettent pas de déterminer l'efficacité du produit. | | | | | | | |

DVP : Dispositif Végétalisé Permanent.

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Liste des usages retirés

| Usages | Dose d'emploi | Nombre maximum d'applications | Délai avant récolte (jours) | Délai accordé pour la vente et la distribution | Délai accordé pour le stockage et l'utilisation des stocks |
|---|---|---|---|---|---|
| **16255901**<br>Céleris*Désherbage | 2 L/ha | 1/an | F | - | 28/09/2026 |
| | **Motivation du retrait :**<br>L'usage est retiré car non pertinent et transformé en l'usage 19275901 céleri-branche*désherbage et déjà inclus dans l'usage 16205901 carotte*désherbage. | | | | |
| **15565901**<br>Sorgho*Désherbage | 3 L/ha | 1/an | F | - | 28/09/2026 |
| | **Motivation du retrait :**<br>L'usage est retiré car transitoire et inclus dans l'usage 15555901 maïs*désherbage. | | | | |

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



## Conditions d'emploi du produit

**Stockage et manipulation du produit**

- Stocker le produit à une température inférieure ou égale à 40 °C.

- Pour l'application du produit, utiliser un dispositif homologué pour limiter la dérive de pulvérisation des produits (se référer à la liste actualisée par note de service publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire), afin de limiter la dissémination de la pendiméthaline dans l'air.

**Protection de l'opérateur et du travailleur**

Des informations générales relatives aux bonnes pratiques de protection pourront être mises à disposition de l'utilisateur :

- l'utilisation d'un matériel adapté et entretenu et la mise en œuvre de protections collectives constituent la première mesure de prévention contre les risques professionnels, avant la mise en place de protections individuelles ;
- le port de combinaison de travail dédiée ou d'EPI doit être associé à des réflexes d'hygiène (ex : lavage des mains, douche en fin de traitement) et à un comportement rigoureux (ex : procédure d'habillage/déshabillage) ;
- les modalités de nettoyage et de stockage des combinaisons de travail et des EPI réutilisables doivent être conformes à leur notice d'utilisation.

***Pour l'opérateur, porter***

**Dans le cadre d'une application effectuée à l'aide d'un pulvérisateur à rampe**

**• pendant le mélange/chargement**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité ;

**• pendant l'application**

Si application avec tracteur avec cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation. Dans ce cas, les gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à l'extérieur de la cabine ;

Si application avec tracteur sans cabine

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN ISO 374-2 (types A, B ou C) à usage unique, dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation ;

**• pendant le nettoyage du matériel de pulvérisation**

- Gants en nitrile certifiés NF EN ISO 374-1/A1 et NF EN 16523-1+A1 (type A) ;
- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ;
- EPI partiel (blouse ou tablier à manches longues) de catégorie III et de type PB (3) à porter par-dessus l'EPI vestimentaire précité.

***Pour le travailleur, porter***

- EPI vestimentaire conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1.

Docusign Envelope ID: B2EFE67B-8099-8739-8263-348C45156DDE



***Délai de rentrée en application de l'arrêté du 4 mai 2017 :***

- 48 heures

**Protection des personnes présentes et des résidents (au sens du règlement (UE) n° 284/2013)**

Respecter une distance d'au moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et :
- l'espace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ;
- l'espace susceptible d'être fréquenté par des résidents.

**Respect des limites maximales de résidus (LMR)**

- Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.
- Ne pas utiliser les sous-produits des cultures porte-graine traitées en alimentation humaine ou animale.

**Protection de l'environnement (milieux, faune et flore)**

***Protection de l'eau***

- SP 1 : Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel d'application près des eaux de surface. Éviter la contamination *via* les systèmes d'évacuation des eaux à partir des cours de ferme ou des routes.

- SPe 1 : Pour protéger les eaux souterraines, suite à l'utilisation sur « maïs » ou « canne à sucre » à une dose supérieure à 2,5 L/ha, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant de la pendiméthaline plus d'une année sur deux.

***Protection de la faune***

- SPe 2 : Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur sols artificiellement drainés pour les usages « choux », « oignon », « poireau », « PPAM » et sur onagre, angélique, livèche.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur « blé », « choux », « cultures florales et plantes vertes », « graines protéagineuses », « légumineuses potagères », « cucurbitacées à peau non comestible », « oignon », « orge », « poireau », « haricots et pois écossés frais », « seigle », « soja », « tabac », « tomate - aubergine », « tournesol », « PPAM - non alimentaires », porte-graine de graminées fourragère, porte-graine de fève, porte-graine de luzerne, onagre, angélique et livèche.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres par rapport aux points d'eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 5 mètres en bordure des points d'eau pour les usages porte graine de coloquinte, de courgette, de citrouille, d'oignon et de potiron.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité d'une largeur de 20 mètres en bordure des points d'eau pour les usages sur « carotte », « céleri-branche » et « salsifis » sur porte graine de concombre, de cornichon, de melon, de luzerne, de trèfle violet, de trèfle incarnat, de trèfle blanc, de sainfoin, de vesce de printemps reine marguerite, de

haricot, de carotte, de persil, de céleri, de panais, de coriandre, d'échalote, de fenouil, de lupin vivace, de choux, de cerfeuil, d'aneth, de chicorées bisannuelles, de pois de senteur, de poireau et de ciboulette et sur coriandre, aneth et cerfeuil, persil, origan, romarin, sarriette vivace et ciboulette.

- SPe 3 : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 50 mètres en bordure des points d'eau et mettre en place des mesures (ou dispositifs) limitant les transferts par ruissellement pour l'usage « canne à sucre ».

- SPe 8 : Peut être dangereux pour les abeilles - Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison des cultures attractives.

## Exigences complémentaires post-autorisation

A défaut de transmission de ces données dans les délais impartis à compter de la date de la présente décision, la présente décision pourra être retirée ou modifiée.

| Détail de la demande post autorisation | Délai (mois) | Récurrence (mois) |
|---|---|---|
| Mettre en place un suivi de la résistance à la pendiméthaline.<br>Fournir, aux autorités compétentes, toute nouvelle information susceptible de modifier l'analyse du risque de résistance. | - | - |

## Recommandations relatives à l'étiquette du produit

Il est recommandé de faire figurer l'information suivante sur l'étiquette :

- Pour prévenir tout risque éventuel de phytotoxicité, préciser les conditions optimales d'implantation des cultures de remplacement.

- Pour prévenir tout risque éventuel de phytotoxicité, préciser les conditions optimales d'application par rapport aux cultures adjacentes.